





Distinguer le Myriophylle du Brésil (*Myriophyllum aquaticum*) des espèces ressemblantes

Critère	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> ⁽¹⁾	<i>Myriophyllum sp</i> *	<i>Ceratophyllum sp</i> *
Aspect général	Plante avec des feuilles aériennes (souvent vert vif et glauque)	Plante submergée, sauf fleurs et bractées émergées.	Plante submergée, sauf fleurs émergées.	Plante submergée, y compris les fleurs
Feuilles	Feuilles verticillées par 5-6		Feuilles majoritairement verticillées par 4	Feuilles verticillées et denticulées
Détails	Pas de bractées. Fleurs rarement produites.	Bractées denticulées. Feuilles immergés à moins de 15 segments.	<i>Myriophyllum spicatum</i> * Fleurs toutes en verticilles. Pétales roses. Feuilles à 13-35 segments.	<i>Ceratophyllum demersum</i> * Feuilles à limbe bifurqué 1-2 fois (2-4 segments terminaux)
				
			<i>Myriophyllum alternifolium</i> * Fleurs en verticilles, sauf les supérieures par 1(2). Pétales jaunes. Feuilles à 8-18 segments.	<i>Ceratophyllum submersum</i> * Feuilles à limbe bifurquée 3 fois (8 segments terminaux)

⁽¹⁾ Ne pas confondre avec *M. verticillatum**, indigène, caractérisé par ses bractées pennées et ses feuilles à plus de 15 segments